


아나필락시스 환아관리카드

등록일자

년 월 일



이름

학년 / 반 / 번호

자가주사용 에피네프린 휴대 ☐ 예 ☐ 아니오

보관위치

알레르기 원인물질

천식 동반여부 ☐ 예(고위험군) ☐ 아니오

이름

보호자

연락처

이용병원명

비고

정보제공자 동의 (날짜/서명)

약한 - 중간 정도의 징후와 증상

- ☐ 입과 목의 얼얼한 느낌
- ☐ 손바닥, 발바닥, 사타구니 쪽 간지러움
- ☐ 피부 홍조
- ☐ 두드러기
- ☐ 얼굴 및 입술 부종

응급처치법

- 환아와 함께 있어주며, **119**에 전화한다.
- 항히스타민제와 처방 받은 스테로이드제를 준다.(약 이름 기재)
- 자가주사용 에피네프린의 위치를 파악하고, 환아의 상태를 관찰한다.



심각한 징후와 증상

- ☐ 쉼 목소리
- ☐ 쉼쉼거리는 소리
- ☐ 짧은 호흡(호흡수가 빨라짐)
- ☐ 의식저하
- ☐ 2개 이상의 증상(피부계, 호흡기계, 심혈관계, 위장관계 증상)
(예시. 두드러기와 호흡곤란)
- ☐ 알고있던 알레르기 원인물질 노출 후 나타나는 반응(경미한 반응 포함)
(예시. 벌에 쏘임 혹은 알레르기 유발 식품을 먹음.)

응급처치법

- 자가주사용 에피네프린을 허벅지 전외측에 주사한다.
- 편평한 곳에 눕힌다.
 - 호흡기계 증상 : 앉히거나 편안한 자세
 - 심혈관계 증상 : 똑바로 눕힌다.
 - 의식저하 혹은 혈압저하 : 다리 밑에 베개를 넣어 다리를 올려준다.
- 119**에 전화한다.
- 보호자에게 연락한다.